

Document de Prescription d'Analyses **BILAN PARASITAIRE Bovin**
 Laboratoire Vétérinaire Départemental du DOUBS
 13 rue Gay Lussac - BP 1981 - 25020 Besançon Cedex - Tél : 03.81.25.88.50 - Mail : lvd25@doubs.fr

LABORATOIRE	Date réception: ___/___/20___
	Référence:

DETENTEUR DEBITEUR N° cheptel : <input type="text" value="2 5"/> Nom : _____ Commune : _____	VETERINAIRE N° national <input type="text"/> Signature: _____ Nom : Dr _____ Clinique : _____
--	--

DÉBITEUR : si autre que détenteur, préciser :	DESTINATAIRES DES RÉSULTATS : DÉTENTEUR + VÉTÉRINAIRE + ...
---	---

Date de prélèvement : ___/___/20___ <input type="checkbox"/> Prélèvement réalisé par le détenteur Conservation : <input type="checkbox"/> réfrigéré <input type="checkbox"/> t° ambiante	COMMEMORATIFS : TRAITEMENTS : <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI : dates et molécules si demande de TREF (test de résistance) : préciser si analyse <input type="checkbox"/> T0 avant traitement ou <input type="checkbox"/> T1 après traitement
--	--

Identifier les prélèvements et Cocher les analyses souhaitées

n° d'ordre lot	Identification Animaux ou lots	COPROSCOPIE							PEPSINOGENE	Séro FASCIULOSE		
		Traitement des échantillons			Recherches attendues				sang sur tube sec	sang sur tube sec		
		Individuel	Mélange à réaliser par LVD	Mélange déjà effectué	semi-quantitatif 20g par analyse		quantitatif (opg) 20g par analyse			larves 50g	Analyses individuelles **	Indiv.
					Détection de : Trématodes Strongles digestifs Trichures Coccidies	si coccidies bovines faire typage	Détection de : Strongles digestifs Strongyloïdes Coccidies sans typage	TREF (test de résistance)	Baermann (Strongles respiratoires)			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

	sérologie Fasciola	sérologie Ostertagia période d'analyse : octobre-novembre
Lait de tank conservé au froid positif, avec bronopol		

**** PEPSINOGENE :**
 période d'analyse : octobre-janvier
 animaux :
 1ère année de pâture en laitier / 1ère et 2e année sous la mère
 prélevés quelques semaines après la fin de pâturage
 pour une bonne interprétation :
 5 à 10 bovins prélevés / lot et analysés individuellement

RAPPELS :

- Analyses de mélange : tenir compte des indications et limites
Mélange réalisé au LVD : conseillé - frais d'échantillons et de mélange facturés au tarif en vigueur
- Recherche de larves de strongles : sur fèces réceptionnés au LVD moins de 12h après prélèvement
- TREF (test de réduction d'excrétion fécale) :
contacter le LVD - 5 à 10 analyses individuelles - 2 fois espacées d'un délai déterminé par le traitement administré
- Analyses transmises par le LVD25 au LDA39 : sérologies Fasciola et Ostertagia - demander conditions et devis

Document de Prescription d'Analyses **BILAN PARASITAIRE Bovin**

Identifier les prélèvements et Cocher les analyses souhaitées

n° d'ordre	lot	Identification Animaux ou lots	COPROSCOPIE						PEPSINOGENE	Séro FASCIULOSE			
			Traitement des échantillons			Recherches attendues			sang sur tube sec	sang sur tube sec			
			Individuel	Mélange à réaliser par LVD	Mélange déjà effectué	semi-quantitatif 20g par analyse		quantitatif (opg) 20g par analyse		larves 50g	Analyses individuelles **	Indiv.	Mélange 5 (à 10 max.) animaux par lots homogènes
						Détection de : Trématodes Strongles digestifs Trichures Coccidies	si coccidies bovines faire typage	Détection de : Strongles digestifs Strongyloïdes Coccidies sans typage	TREF (test de résistance)				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													